


# Avertissements ILE DE FRANCE agricoles



ISSN 0767 - 5542

## Grandes cultures

BULLETIN N° 602 DU 19 NOVEMBRE 1990 – ENVOI 30

**COLZA** – *Pas d'intervention*

**CEREALES** – *Arrêt des vols de pucerons, mais surveiller*

– *Bilan cicadelles.*

### COLZA

#### ■ MALADIES :

Les feuilles les plus âgées sont porteuses de taches de phoma, pseudocercospora et mildiou.

————> *Pas d'intervention à l'automne* , car les maladies sont peu développées et l'effet d'un traitement serait nul sur le rendement.

### CEREALES

#### ■ JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE :

– *Situation* : – Les vols de pucerons sont toujours nuls. Il n'y a donc pas d'arrivée de pucerons ailés sur les cultures.

– Par contre, le temps doux maintient l'activité des aptères qui étaient présents sur les cultures. Ils peuvent se nourrir, donc transmettre le virus responsable de la maladie, et se multiplier.

– *Préconisation* : 1) Parcelles levées à partir de la fin octobre : aucune intervention. Il n'y a pas de pucerons.

2) Parcelles levées en octobre : maintenir la surveillance surtout  
– sur les escourgeons, beaucoup plus sensibles,  
– s'il n'y a pas eu d'intervention,  
– ou si un traitement précoce arrive en fin de rémanence.  
En effet, les quelques pucerons présents poursuivent leur activité et se déplacent de pied en pied

\* Intervention justifiée si 1 pied sur 10 porte des pucerons.

756



## B L E

### ■ MALADIE DES PIEDS CHETIFS :

—> **SITUATION ACTUELLE** : les piégeages sont presque nuls car les vols de cicadelles ont cessé. Les insectes se déplacent uniquement par petits sauts. Les températures et l'humidité actuelle ne sont pas favorables à une forte activité de l'insecte : il faut en effet une température au sol d'au moins 15 à 20°

—> **QUE FAIRE** ? Seules quelques parcelles nécessitent une intervention : semis précoces avec des parcelles exposées au Sud et près de bois ( Essonne et Sud Yvelines).

Intervenir dans ce cas avec DECIS 0,3l ou KARATE 0,15l , par temps ensoleillé et calme lorsque l'insecte est présent.

Mais : l'efficacité de ce genre d'intervention est incertaine. Il n'y a aucune référence sur le sujet même si les deux produits cités ont obtenu une dérogation. La transmission de la maladie par l'insecte étant rapide, il est probable que les traitements réalisés soient trop tardifs.

En tout cas, il est inutile de reintervenir si vous avez déjà traité.

### ■ MOUCHE GRISE : Résultats des analyses de terre sur précédents betteraves.

—> Risque très faible cette année :

Le traitement de semences T4 sera suffisant.

## BROCHURE RESULTATS D'ESSAIS REGIONAUX

*Vous pouvez encore la commander*

NOM

Prénom

Adresse

– Je désire recevoir      exemplaire(s) de la brochure des résultats du S.R.P.V ILE DE FRANCE

– Je désire une facture oui – non

– Je joins 20 timbres à 2,30 FRS par exemplaire demandé

Si vous souhaitez une autre forme de paiement : téléphonez au 42/87/76/71.